

Yo me vacuno

*Porque me cuido
y cuido a los demás*



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN IGNACIO**

CIENCIA Y TECNOLOGIA CON PROYECCION SOCIAL

Vencer al COVID-19 es un compromiso de todos
¡Unidos somos más!

Recomendaciones post vacunales -Vacunación COVID-19



Las vacunas contra el COVID-19 son seguras.

En el sitio de aplicación puede presentar dolor, enrojecimiento, inflamación y calor local. Colóquese paños o compresas frías en la zona de aplicación de la vacuna, en series de 15 minutos, cuatro veces al día durante las primeras 48 horas. Recuerde no utilizar prendas ajustadas.



Otros síntomas generales posterior a la vacunación son: dolor articular, fiebre, sensación de mucho cansancio y dolor de cabeza, estos no durarán más de tres días.

De manera infrecuente, la vacunación puede causar efectos secundarios más graves como reacciones alérgicas, las cuales pueden presentarse por cualquier componente de la vacuna.



Ante la posibilidad de aparición, usted será vigilado en el centro de vacunación por 15 minutos si no tiene antecedente de alergias y por 30 minutos si tiene antecedente. Sin embargo, es adecuado recordar que los riesgos de la enfermedad de COVID-19 son mayores que los efectos adversos de la vacuna.

No se recomienda la ingesta de antiinflamatorios (acetaminofén, ibuprofeno u otro AINES) o antimicrobianos después de la vacunación **para evitar la aparición de síntomas** locales o sistémicos.



Solo si presenta malestar general y temperatura mayor a 37.8 grados centígrados, puede tomar acetaminofén.

Posterior a recibir la primera dosis de vacuna (para los esquemas de vacunación que constan de dos dosis), recuerde agendar la fecha y hora de su segunda dosis antes de salir del centro de vacunación.