

III TOSFERINA

El coqueluche o tosferina es una infección respiratoria aguda, altamente contagiosa, cuyo agente causal es la bacteria *Bordetella pertussis*. Esta enfermedad puede afectar a individuos de cualquier edad. Entre las complicaciones pueden estar: neumonía, convulsiones, otros problemas neurológicos, hipertensión pulmonar, desnutrición, hernias, ... evolucionando en algunos casos hacia la muerte. La enfermedad se caracteriza por un período catarral que se semeja a un resfriado común, posteriormente aparecen severos ataques de tos que puede durar varios meses.. La vacuna se debe administrar preferiblemente a los adolescentes, padres y cuidadores de los recién nacidos y lactantes.

III HEPATITISA

Es una infección viral del hígado que afecta a los niños, adolescentes y adultos, puede ser sintomática y grave con el aumento de la edad. Su manifestación va desde la ausencia total de síntomas hasta la hepatitis A fulminante.

Su transmisión es esencialmente fecal-oral favorecida por malas condiciones sanitarias y de higiene, contacto íntimo con una persona infectada, y los alimentos que se consumen crudos o poco cocidos. En situaciones especiales puede contraerse por contacto sexual directo y el contacto con la sangre infectada.

La vacunación se recomienda a partir del año de edad en una dosis inicial y refuerzo a los 6 meses.

III FIEBRE AMARILLA

Es una enfermedad viral que se transmite a través de los mosquitos *Aedes aegypti* y *haemagogus*, que se encuentran principalmente en el centro y el sur de América y en las zonas tropicales de África. La forma aguda de esta enfermedad puede causar la muerte en los 10 primeros días de su desarrollo, por lo que la prevención se vuelve indispensable.

III FIEBRE TIFOIDEA

Es una enfermedad potencialmente fatal, causada por una bacteria llamada *Salmonella typhi* que llega al tracto digestivo por vía fecal-oral y luego se propaga al resto del cuerpo a través de la sangre.

Los vehículos de contagio son el agua y los alimentos contaminados, pero puede infectarse también, directamente de persona a persona.

La fiebre tifoidea es aún un grave problema de salud pública a nivel mundial y la tasa de mortalidad sigue siendo significativa, ya que su detección tardía o el tratamiento inapropiado pueden conducir a un desenlace fatal.

Se recomienda vacunar a todas las personas mayores de 16 años que viven o viajan a lugares de alta incidencia y a los manipuladores de alimentos.

III VARICELA

Enfermedad eruptiva altamente contagiosa que afecta todas las edades y puede tener complicaciones como sobre infección bacteriana de las lesiones y neumonía entre otras.

Se deben vacunar todas las personas a partir del año de edad que no han sufrido la enfermedad, especialmente mujeres en edad fértil, personal de salud y contactos cercanos de individuos enfermos.

III NEUMONÍA POR NEUMOCOCO

Es una bacteria altamente contagiosa y potencialmente fatal en personas que tengan condiciones de riesgo como enfermedades crónicas: pulmonares, cardíacas, del sistema inmune, diabetes, trasplantes, asmáticos y fumadores o tener más de 60 años de edad.

Existe la vacuna "polisacárida" de 23 serotipos. Todas las personas a partir de los 2 años de edad con condiciones de alto riesgo para enfermedad invasiva deben vacunarse. También debe ser aplicada en todos los adultos mayores de 60 años independientemente de su estado de salud.

Mayor información

Servicio de Vacunación
Hospital Universitario San Ignacio

Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados, Domingos y Festivos 7:00 a.m. a 12 m.

Ofrecemos información completa sobre
vacunación adultos y niños



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN IGNACIO**

CIENCIA Y TECNOLOGIA CON PROYECCION SOCIAL

Unidad de Vacunación
Hospital Universitario San Ignacio
Segundo piso.
Tel. 594 6161 Ext. 2498



Vacunación preventiva para adolescentes y adultos sanos



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN IGNACIO**

CIENCIA Y TECNOLOGIA CON PROYECCION SOCIAL

¿Qué es la vacunación?

Es la aplicación de sustancias llamadas antígenos que tienen la capacidad de provocar respuesta del sistema inmunológico, llamados anticuerpos, encargados de defender al organismo contra las infecciones, muchas de ellas son graves e incluso mortales. Su objetivo inicial es la protección de cada uno de los individuos vacunados, pero a largo plazo, se busca erradicar la enfermedad, tal como sucedió con la viruela.

¿Qué es una vacuna?

Es un producto biológico que al ser administrado a un organismo produce una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigido.

Es la mejor y más eficaz forma de protección contra las enfermedades infecciosas graves.

¿Existe alguna contraindicación?

Son pocas las contraindicaciones absolutas para la vacunación. Al contrario la ausencia de vacunación supone un riesgo costoso y grave frente a los elevados gastos y consecuencias que el contagio de cualquier enfermedad pueda traer, consulte con su médico.

¿Hay algunos efectos secundarios en las vacunas?

Las vacunas son muy seguras. Algunos de los efectos secundarios más comunes son el dolor en el sitio de aplicación y fiebre. Hay poco riesgo de complicaciones severas después de recibir la vacuna. Sin embargo, los riesgos de las enfermedades son mayores que los efectos adversos de las vacunas.

¿Qué pasaría si se aplica una sola dosis de vacuna cuando se requiere de tres dosis?

La recomendación es la de continuar el esquema de vacunación, es decir se deben aplicar las dosis restantes para completar el esquema.

Para asegurar la efectividad de las vacunas se recomienda completar los esquemas de vacunación que nos garantizan una adecuada inmunidad.

Se debe seleccionar con criterio sus vacunas buscando respaldo profesional, garantiza calidad y eficacia en su vacunación.

¿Debo llevar un certificado personal de vacunación?

¡Definitivamente sí! un carnet personal permanente de inmunizaciones debe ser llevado por todos los adultos vacunados. Le ayudará a usted y a su médico asegurar su protección contra las enfermedades que pueden prevenirse por medio de vacunas. También se puede evitar la revacunación innecesaria durante una emergencia de salud o cuando cambie de médico.

VACUNAS	DOSIS E INDICACIONES
Hepatitis B	3 dosis. (0, 1 y 6 meses) Adultos no vacunados en la infancia o la adolescencia.
Toxoides de Tétanos y Difteria combinada con componente acelular de Pertussis	1 dosis con refuerzo cada 10 años adolescentes y adultos
Triple Viral (Sarampión, Paperas, Rubéola)	1 dosis con refuerzo cada 10 años.
Influenza	1 dosis anual.
Hepatitis A	2 dosis.
Fiebre Amarilla	1 dosis Residentes o viajeros a zonas endémicas y aplicación durante epidemias.
Rabia	Pre-exposición: 3 dosis. Pos-exposición: 5 dosis.
Varicela	1 dosis. Adultos no vacunados y mujeres en edad fértil.
Neumococo	1 dosis. En grupos de riesgo y todos los adultos mayores de 60 años.
Fiebre Tifoidea	1 dosis. Refuerzo cada 3 años.
Tétanos - difteria	1-2 dosis con refuerzo cada 10 años en especial mujeres en embarazo.
Meningitis por Meningococo	Una sola dosis desde los 2 años hasta los 55 años

HEPATITIS B

Es una enfermedad viral que afecta el hígado, y que cuando se hace crónica puede producir cirrosis, cáncer de hígado y hasta la muerte. Es diez veces más contagioso que el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

El contagio con el virus de la Hepatitis B se produce por contacto sexual o por contacto con secreciones y/o sangre de personas infectadas. Las situaciones más comunes que conducen a este tipo de contactos son las relaciones sexuales, el uso compartido de agujas y jeringas, las perforaciones corporales o la realización de tatuajes, sin tomar las medidas de prevención necesarias.

MENINGITIS POR MENINGOCOCO

La meningitis es una inflamación de las meninges, que puede ser causada por virus y bacterias. La meningitis meningocócica es una infección causada por una bacteria llamada meningococo.

Esta enfermedad puede iniciar como un resfriado común con fiebre, dolor de cabeza, vómito y en ocasiones lesiones en la piel de color púrpura, que van progresando a lesiones más grandes que pueden comprometer la extremidad. Es una enfermedad que progresa rápidamente y puede ser letal o dejar graves complicaciones y secuelas como amputación de miembros o dedos, sordera, parálisis y daño cerebral entre otros.

La mejor forma de prevenirla es por medio de la vacunación, la cual está indicada a partir de los dos hasta los 55 años de edad una sola dosis.

TETANOS - DIFTERIA

El tétanos es una de las complicaciones más preocupantes después de una herida, la enfermedad se caracteriza por rigidez de los músculos, convulsiones y/o incapacidad para respirar.

Se debe administrar a todas las personas y en especial a mujeres en edad fértil para evitar los casos de tétanos neonatal.

Se aplica una dosis con refuerzo cada 10 años. También debe ser aplicada una dosis de refuerzo en caso de herida sucia o de alto riesgo, si la última dosis se recibió después de 5 años.

INFLUENZA

Infección respiratoria viral que se contagia fácilmente de persona a persona. Esta vacuna se produce cada año siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), debido a que el virus muta constantemente, la vacunación es de aplicación anual y protege contra la influenza y sus complicaciones como la neumonía entre otras.