

RECOMENDACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE TIMPANOSTOMÍA CON COLOCACIÓN DE TUBOS DE VENTILACIÓN

La cirugía de colocación de tubos de ventilación en los oídos (timpanostomía con tubos de ventilación) es una cirugía que busca disminuir la frecuencia de infecciones en los oídos y la presencia de líquido dentro del oído medio, mejorando la ventilación del oído y equilibrando las presiones. Busca también mejorar la pérdida de audición, el dolor de oído y las alteraciones del equilibrio en algunos pacientes.

Esta cirugía es un procedimiento de corta duración, bajo riesgo de complicaciones y poco invasiva, sin embargo, se deben seguir las siguientes recomendaciones para asegurar un adecuado postoperatorio.

1

Esta cirugía en general es poco dolorosa, en algunos casos es necesario formular unas pocas dosis de analgésico para controlar el dolor.

2

Los pacientes operados pueden reiniciar su actividad normal al día siguiente de la cirugía. La actividad física no hará que los tubos se salgan.

3

Los tubos de ventilación serán expulsados de la membrana timpánica en un tiempo variable, entre 6 meses y año y medio. Algunos pacientes los expulsan antes, otros después, dependiendo de cada caso.

4

En el 1% de los casos aproximadamente, el tubo en vez de extruirse, queda retenido en la membrana timpánica. Si al cabo de dos años y medio de la cirugía se encuentra esta situación, se requerirá hacer otro procedimiento para extraer el tubo.

5

Cundo el tubo es expulsado, la membrana timpánica cicatriza sin dejar secuelas. Sólo en 1 - 2% de los casos el tubo, al ser expulsado deja una pequeña perforación en la membrana timpánica que debe ser cerrada con otro procedimiento.

6

En la mayoría de los pacientes, sólo requieren un juego de tubos para disminuir la frecuencia de otitis. Sin embargo, en algunas ocasiones se requiere más de una cirugía para controlar completamente la recurrencia de la enfermedad.



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN IGNACIO**

CIENCIA Y TECNOLOGIA CON PROYECCION SOCIAL

**Unidad de Otorrinolaringología
y Cirugía Maxilofacial**
www.husi.org.co

RECOMENDACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE TIMPANOSTOMÍA CON COLOCACIÓN DE TUBOS DE VENTILACIÓN

7

En un porcentaje variable, los pacientes operados de tubos pueden tener “otorrea” o supuración por los oídos. Esta puede corresponder a la salida de la secreción que se encontraba acumulada en el oído, o puede estar asociada a un episodio de gripa fuerte o un eventual episodio de otitis media.

8

Esto no significa que la cirugía haya salido mal, se espera que algunos pacientes presenten supuración en algún momento de su post-operatorio.

9

Esta cirugía en general es poco dolorosa, en algunos casos es necesario formular unas pocas dosis de analgésico para controlar el dolor.

10

En casi todos los casos, la supuración se controla con la aplicación por pocos días de gotas con antibiótico y no requiere antibióticos orales.

11

Estas gotas SOLAMENTE pueden ser formuladas por nuestro equipo médico, ya que algunas gotas disponibles en el mercado pueden representar riesgo de ocasionar pérdida permanente de la audición.

12

Los pacientes operados pueden bañarse en la ducha sin problema después de la cirugía. Se recomienda no sumergirse en el agua de piscinas, ríos, lagos, etc. No se aconseja el uso de baño turco.

13

Es normal después de esta cirugía, sentir el oído tapado.



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN IGNACIO**

CIENCIA Y TECNOLOGIA CON PROYECCION SOCIAL

Unidad de Otorrinolaringología
y Cirugía Maxilofacial
www.husi.org.co