

¿QUÉ ES?

Es la obtención de una pequeña muestra de la glándula salival ubicada en el labio inferior, que se obtiene con el objetivo de confirmar enfermedades autoinmunes como síndrome de sjögren (enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca partes de su propio cuerpo por error), amiloidosis, linfoma, entre otras. Este procedimiento requiere la administración de anestesia local y posteriormente, se practica una pequeña incisión en el labio inferior a través de la cual se obtendrá la muestra requerida. Finalmente, se realiza el cierre de la herida mediante sutura.

PREPARACIÓN Y ASPECTOS IMPORTANTES PREVIOS AL PROCEDIMIENTO

No requiere preparación especial, ni suspender los medicamentos que viene consumiendo habitualmente.

RECOMENDACIONES POSPROCEDIMIENTO

- **No escupir**, no hacer buches.
- Estricta higiene oral (**no hay restricción para el uso de enjuagues orales**).
- Alimentación sin ninguna restricción.
- Aplicar frío en la zona por las primeras **72 horas**.
- En caso de sangrado, realizar presión en la zona con una gasa.
- Asistir a control en **15 días**.
- Tomar la medicación dada por el médico tratante.

POSIBLES COMPLICACIONES

Las complicaciones más comunes reportadas en las biopsias de glándulas salivales labiales son las siguientes:

1. Alteración sensorial localizada (frecuentemente descrita con los términos **anestesia, pérdida de sensibilidad reducida o parcial, entumecimiento transitorio e hipoestesia; es decir, deficiencia de la sensibilidad táctil**), puede durar unos meses o puede ser permanente.
2. Hematoma (**sangrado**) externo.
3. Inflamación local.
4. Formación de granuloma, (**hinchazón**), producto de la respuesta inflamatoria del cuerpo.
5. Formación de cicatrices internas y queloides (**cicatriz pronunciada y levantada**).
6. Dehiscencia de la herida (**separación de los bordes de la herida**).
7. Dolor local.
8. Muestra insuficiente que imposibilite el diagnóstico histopatológico.

SIGNOS DE ALARMA PARA RE CONSULTAR

- Sangrado no controlable.
 - Dolor no controlable con medicación.
 - Secreción purulenta.
 - Fiebre.
-

CONTROLES POST PROCEDIMIENTO

- Asistir a control en 15 días.
 - El resultado de la biopsia es entregado por el servicio de patología.
-

CONTACTOS PERMANENTES

Recuerde que, ante la aparición de signos o síntomas de alarma, debe dirigirse de inmediato al servicio de Urgencias del **Hospital Universitario San Ignacio**.

En caso de presentar una condición de urgencia vital o que amenace la vida, debe comunicarse con la **línea de emergencias 123** o la empresa privada que usted tenga contratada, informar que le fue practicado este procedimiento recientemente y seguir las instrucciones allí indicadas.