


# Información para pacientes IRIDOPLASTIA

## ¿QUÉ ES?

Es pertinente definir que el iris está ubicado en el frente del ojo y es el tejido que le da el color al mismo. En su centro, se encuentra la pupila y el iris, ayuda a controlar el tamaño de esta para permitir la entrada de más o menos luz en el ojo. Por otra parte, la iridoplastia es un tratamiento que consiste en realizar impactos con láser (forma amplificada de la luz) sobre la periferia del iris. Lo cual permite que, de manera mecánica, se conserve abierto el ángulo existente entre la córnea (capa externa del ojo) y el iris.



## PREPARACIÓN Y ASPECTOS IMPORTANTES PREVIOS AL PROCEDIMIENTO

- 30 minutos antes del procedimiento, se aplicará un medicamento en el ojo llamado pilocarpina al 2%, y posteriormente una solución anestésica (tetracaína o benoxinato HCL al 0,4%).
- No requiere ayuno, ni condiciones especiales.
- No requiere suspender medicamentos de uso permanente.
- Todos los pacientes deben firmar el consentimiento informado previo a la realización del examen.

## RECOMENDACIONES POSPROCEDIMIENTO

Posterior al tratamiento, debe aplicarse un medicamento en el ojo llamado acetato de prednisolona 1% así: una gota en el ojo intervenido cada 6 horas por 4 o 7 días (el médico le informará el número exacto de días según su caso) y suspender posteriormente.

## POSIBLES COMPLICACIONES

- Sangrado del iris.
- Elevación transitoria de la presión intraocular (conocida como la presión de los líquidos dentro del ojo).
- Quemadura corneal.

## CONTROLES POST PROCEDIMIENTO

El paciente deberá acudir a control con el médico tratante de 24 a 48 horas posterior a procedimiento.

## CONTACTOS PERMANENTES

Recuerde que, ante la aparición de signos o síntomas de alarma, debe dirigirse de inmediato al servicio de Urgencias del **Hospital Universitario San Ignacio**.

En caso de presentar una condición de urgencia vital o que amenace la vida, debe comunicarse con la **línea de emergencias 123** o la empresa de emergencias privada que usted tenga contratada, informar que le fue practicado este procedimiento recientemente y seguir las instrucciones allí indicadas.