



# PREVENCIÓN DE CÁNCER CAUSADO POR EL VPH

*¡El cambio lo hacemos todos!*



HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN IGNACIO

CIENCIA Y TECNOLOGIA CON PROYECCION SOCIAL

# ¿Qué es el VPH y por qué es importante prevenirlo?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una **infección** muy común que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Se transmite principalmente por contacto sexual y, en algunos casos, puede causar cáncer.

De acuerdo con la **Organización Mundial de la Salud (OMS)**, casi todos los casos de cáncer de cuello uterino están relacionados con la infección por VPH.

Prevalencia de infección por VPH:



70%



80%

Muchas personas no saben que están infectadas.

## Enfermedades relacionadas con el VPH



### Cáncer de Cuello Uterino:

Es la multiplicación de células malignas que comienzan en el cuello del útero, parte baja que conecta con la vagina.




La infección persistente por el VPH puede causar cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, ano y cavidad orofaríngeo.

Otros tipos de cáncer asociados al VPH pueden prevenirse con vacunación y hábitos saludables.



Uso de preservativo



Inicio tardío de relaciones sexuales



Pareja sexual estable



Cesar el tabaquismo

## Prevención

### ¡Vacunación, una gran decisión!

En Colombia existen dos tipos de vacuna:

**Tetravalente:** protege contra 4 genotipos del virus.

**Nonavalente:** cubre un mayor número de genotipos asociados al cáncer.



La vacuna es segura y se han aplicado más de 270 millones de dosis en todo el mundo.

## En Colombia el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) cubre:



Niños y niñas de 9 a 17 años.

La vacuna nonavalente cuenta con un esquema de tres dosis.

La vacuna (PAI) tiene un esquema de dosis única.

**Si recibiste la vacuna tetravalente y deseas completar con la Nonavalente, debes esperar un año.**


No hay estudios concluyentes sobre la intercambiabilidad de dosis.

Está en investigación la efectividad del esquema de dos dosis de la vacuna Nonavalente.

## DetECCIÓN TEMPRANA

### ¡CUIDATE PARA QUE EL VIRUS DEL VPH NO TE ATRAPE!

Existen formas seguras y eficaces de detectar tempranamente en la etapa del precáncer la infección:



- Citología de cuello uterino.
- **Pruebas de ADN para VPH:** pueden realizarse de forma convencional o por autotoma vaginal.

La detección en etapas tempranas aumenta las posibilidades de tratamiento efectivo.

- Vacunación en el HUSI



## RECUERDA

**Vacunarte es una decisión que protege tu salud y la de quienes te rodean.**

- Consulta con tu médico para más información.
- Prevenir el VPH es posible y está en tus manos.

## HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

Si deseas vacunarte puedes acercarte al punto de vacunación HUSI en el segundo piso.

**Dirección:**  
Carrera 7 #40-42

### HORARIO DE ATENCIÓN:

**Lunes a viernes**  
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

**Sábados**  
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

**Para trabajadores del HUSI:**  
aplica descuento por nómina.



CIENCIA Y TECNOLOGIA CON PROYECCION SOCIAL