

ACETATO DE GOSERELINA 10.8 MG


¿QUÉ ES?

El **acetato de goserelina 10.8 mg** es un medicamento que pertenece al grupo de los **análogos de la hormona liberadora de gonadotropina** (GnRH). Su función es disminuir temporalmente la producción de hormonas sexuales (testosterona en hombres y estrógenos en mujeres), lo que ayuda a controlar el crecimiento de algunos tipos de cáncer sensibles a estas hormonas, como el de próstata, mama o ciertos tumores ginecológicos.

PRESENTACIÓN DE 10.8 MG

La goserelina 10.8 mg se aplica cada 12 semanas (**3 meses**) por un profesional de salud entrenado.

¿DÓNDE SE APLICA?



La goserelina se administra como un implante subcutáneo que se inserta bajo la piel, generalmente en el **abdomen en la zona grasa**.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Estos efectos pueden variar según cada persona y suelen mejorar con el tiempo:

- 1 Sofocos** o sensación de calor repentino.
- 2 Sudoración** nocturna.

Porque mi salud también está en mis manos, yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.



- 3 Cansancio** o sensación de falta de energía.
- 4** Cambios en el estado de **ánimo**.
- 5** Aumento de peso leve.
- 6** Disminución de la masa muscular y densidad ósea (**si el tratamiento es prolongado**).
- 7** Dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación.
- 8 Disminución del deseo sexual**.
- 9** En mujeres: **sequedad vaginal** o ausencia temporal del periodo menstrual.
- 10** En hombres: **sensibilidad** o aumento del tamaño de las mamas.

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE

- 1 Mantenga una alimentación** balanceada y una buena hidratación.
- 2 Es normal sentir molestia leve**, enrojecimiento o una pequeña protuberancia en el sitio de la inyección (puede ser del tamaño de una lenteja); no la frote, ni la masajee.
- 3 Realice actividad física regular**, especialmente ejercicios que fortalezcan músculos y huesos.
- 4 Siga las recomendaciones sobre calcio y vitamina D** que su equipo médico considere necesarias para proteger su salud ósea durante el tratamiento; recuerde que la formulación depende de cada caso.
- 5 No suspenda el medicamento** sin consultar a su médico.
- 6 Informe si presenta dolor**, enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación.
- 7 Evite fumar** y limite el consumo de alcohol.
- 8 Asista puntualmente a sus controles** y aplicaciones trimestrales.
- 9** Si nota sofocos intensos, cambios emocionales, dolor óseo o síntomas nuevos, **comuníquelo al equipo médico**.

**Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.**