

ACETATO DE GOSERELINA 3.6 MG

¿QUÉ ES?

El **acetato de goserelina** es un medicamento que ayuda a controlar la cantidad de hormonas sexuales que produce el cuerpo. Estas hormonas, como el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los hombres, pueden hacer que ciertos tipos de cáncer crezcan más rápido.

La **goserelina** actúa bloqueando la señal que le indica al cuerpo producir esas hormonas, de modo que sus niveles bajan. Al disminuirlas, las células cancerosas dejan de crecer o lo hacen más lentamente. La goserelina ha demostrado ser un **tratamiento efectivo y seguro** para controlar algunos cánceres que dependen de las hormonas, como:

- El **cáncer de mama en mujeres** que aún tienen su periodo menstrual.
- El cáncer de próstata en hombres.

PRESENTACIÓN DE 3.6 MG

El acetato de goserelina 3.6 mg viene en forma de un implante de liberación prolongada. Libera el medicamento de manera continua durante aproximadamente 28 días, por eso **se aplica una vez al mes**.

¿DÓNDE SE APLICA?



La goserelina se administra como un implante subcutáneo que se inserta bajo la piel, generalmente en el **abdomen en la zona grasa**.

Porque mi salud también está en mis manos, yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Durante el tratamiento con goserelina pueden presentarse algunos efectos relacionados con la disminución de las hormonas sexuales. **No todas las personas los sienten** y, en la mayoría de los casos, **son temporales o manejables**.

Los más frecuentes son:

- 1 Sofocos o sensación de calor repentino.**
- 2 Sudoración nocturna.**
- 3** Cansancio o sensación de falta de energía.
- 4 Disminución del deseo sexual.**
- 5** Dolor, enrojecimiento o endurecimiento en el sitio de la inyección.
- 6 Sequedad vaginal** en mujeres o molestias en las relaciones sexuales.
- 7 Cambios en el estado de ánimo**, como irritabilidad o tristeza.
- 8** Aumento leve de peso o pérdida de masa muscular con el tiempo.
- 9** Dolor de cabeza leve.
- 10 Cambios en el ciclo menstrual** (los periodos pueden volverse irregulares o detenerse mientras dura el tratamiento).

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE

- 1 Mantenga una alimentación balanceada** y una buena hidratación.
- 2 Es normal sentir molestia leve**, enrojecimiento o una pequeña protuberancia en el sitio de la inyección (puede ser del tamaño de una lenteja); no la frote, ni la masajee.
- 3 Realice actividad física regular** para conservar la masa muscular y proteger los huesos.
- 4 Siga las recomendaciones sobre calcio y vitamina D** que su equipo médico considere necesarias para proteger su salud ósea durante el tratamiento; recuerde que la formulación depende de cada caso.
- 5 No suspenda el medicamento** sin consultar a su médico.
- 6 Informe a su equipo de salud** si presenta dolor, enrojecimiento de gran tamaño o inflamación en el sitio de aplicación que no mejora con el paso de los días.
- 7** Si nota cambios emocionales, sofocos intensos o alteraciones menstruales importantes, **comuníquelo a su médico para manejo oportuno**.
- 8 Evite fumar y el consumo** excesivo de alcohol.
- 9 Asista puntualmente** a sus controles y aplicaciones mensuales.

**Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.**