

ACETATO DE LANREOTIDE 120 MG

¿QUÉ ES?

Es un **medicamento similar a la somatostatina (hormona elaborada por el cuerpo)** que se usa para el tratamiento de ciertos tipos de **tumores neuroendocrinos en el páncreas o en el intestino**, el síndrome carcinoide y la acromegalia (una enfermedad en la que la glándula hipófisis produce demasiada hormona del crecimiento). **El acetato de lanreotide ayuda a disminuir la producción de ciertas hormonas** y a controlar el crecimiento de algunos tipos de células tumorales.

PRESENTACIÓN DE 120 MG

Esta formulación de liberación prolongada, lo que significa que el medicamento se libera poco a poco en el cuerpo y controla los síntomas durante aproximadamente **4 semanas. Por eso, se aplica una vez al mes.**

¿DÓNDE SE APLICA?



Se administra mediante una **inyección subcutánea profunda**, generalmente en la **región glútea** y debe ser administrado por personal de salud capacitado, para asegurar que el medicamento se coloque correctamente y evitar molestias o complicaciones.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

La mayoría son leves y transitorios, y tienden a mejorar con el tiempo:

- 1 Dolor** o enrojecimiento leve en el sitio de aplicación.

Porque mi salud también está en mis manos, yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.



- 2 Molestias digestivas**, como gases, náuseas o dolor abdominal leve.
- 3 Cambios en las deposiciones (estreñimiento o diarrea).**
- 4 Cansancio** o debilidad.
- 5 Dolor de cabeza.**
- 6** En tratamientos prolongados, puede presentarse formación de cálculos biliares.
- 7 Si los síntomas son intensos** o persistentes, informe a su equipo de salud.

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE

- 1 Mantenga una alimentación balanceada**, baja en grasas, para reducir molestias digestivas y prevenir cálculos biliares.
- 2 Beba suficiente agua** durante el día para evitar el estreñimiento.
- 3 Evite comidas muy grasosas o abundantes** justo antes y después de la aplicación.
- 4 Si tiene diabetes o tendencia a la hipoglucemia**, controle sus niveles de azúcar y avise a su médico si nota cambios.
- 5 No suspenda el medicamento** sin orientación médica.
- 6 Informe si presenta dolor**, enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación.
- 7 Asista puntualmente** a sus aplicaciones mensuales y controles médicos.
- 8 Informe de inmediato si presenta dolor abdominal fuerte** o persistente, ya que puede ser un signo de cálculos biliares.

***Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.***