

ACETATO DE OCTREOTIDA 30 MG

¿QUÉ ES?

El **acetato de octreotida es un medicamento similar a una hormona natural del cuerpo llamada somatostatina**. Su función es bloquear la producción excesiva de ciertas hormonas, estas hormonas, cuando se producen en grandes cantidades, pueden causar síntomas como diarrea, enrojecimiento de la piel o crecimiento anormal de algunos órganos o tejidos.


Este medicamento se usa para tratar:

- **Acromegalia**, una enfermedad en la que el cuerpo produce demasiada hormona del crecimiento.
- Algunos **tumores del páncreas o del intestino**, que liberan hormonas en exceso.
- También puede usarse para prevenir complicaciones después de cirugías del páncreas, según indicación médica.

PRESENTACIÓN DE 30 MG

La presentación de **30 mg** corresponde a una formulación de liberación prolongada, lo que significa que el medicamento actúa de forma continua en el organismo durante varias semanas.

¿DÓNDE SE APLICA?



Se aplica **una vez al mes** por vía **intramuscular profunda**, alternando entre el glúteo derecho e izquierdo por un profesional de la salud entrenado, ya que requiere una técnica especial para asegurar su correcta absorción.

*Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.*



POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Durante el tratamiento con acetato de octreotida pueden presentarse algunos efectos secundarios, la mayoría son leves y controlables:

- 1** **Molestia o dolor leve** en el sitio de aplicación.
- 2** **Náuseas, gases o dolor abdominal leve.**
- 3** Cambios en las deposiciones (**estreñimiento o diarrea**).
- 4** **Cansancio** o debilidad.
- 5** Dolor de cabeza.
- 6** Alteraciones en los niveles de azúcar en sangre (pueden subir o bajar).
- 7** En algunos casos, formación de cálculos biliares (por uso prolongado).
- 8** **Si los síntomas son persistentes o intensos, comuníquelo a su equipo de salud.**

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE

- 1** **En algunos casos, la aguja puede obstruirse durante el procedimiento;** si esto sucede, puede ser necesario repetir la aplicación en el otro glúteo para asegurar que el medicamento se administre correctamente.
- 2** **Mantenga una alimentación balanceada,** baja en grasas y rica en frutas y verduras.
- 3** **Hidrátese bien** durante el tratamiento.
- 4** **Evite el consumo de alcohol y comidas muy grasosas** para prevenir molestias digestivas.
- 5** **Informe a su médico** si tiene diabetes o cambios en sus niveles de azúcar en sangre.
- 6** **No suspenda el medicamento** sin orientación médica.
- 7** **Asista puntualmente** a sus controles y aplicaciones mensuales.
- 8** **Si presenta dolor intenso,** enrojecimiento o hinchazón en el sitio de aplicación, avise al personal de salud.

Porque mi salud también está en mis manos, yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.