

DARATUMUMAB SUBCUTÁNEO 1800MG

¿QUÉ ES?

El **Daratumumab** es un medicamento que se utiliza para tratar el **mieloma múltiple**, un tipo de cáncer que afecta las células de la **médula ósea**, lugar donde se producen las células de la sangre. Es un anticuerpo monoclonal, lo que significa que está diseñado para reconocer y atacar de forma específica las células cancerígenas.

Este medicamento actúa de dos maneras principales:

- **Estimula el sistema inmunológico** para que identifique y elimine las células malignas.
- **Bloquea el crecimiento y la multiplicación** de esas células anormales.

Gracias a estos mecanismos, el Daratumumab **ayuda a controlar la enfermedad y mejorar la respuesta al tratamiento**.

PRESENTACIÓN DE 1800 MG

Su presentación es en una **dosis fija de 1800 mg**, que no depende del peso del paciente, a diferencia de la versión intravenosa. La evidencia científica ha demostrado que esta forma subcutánea **es igual de eficaz y segura** que la intravenosa, pero con **la ventaja de ser más rápida y cómoda para el paciente**.

¿DÓNDE SE APLICA?



El medicamento se aplica bajo la piel (subcutánea), generalmente en la **región abdominal**. La aplicación dura entre **3 y 5 minutos**.

Antes de la aplicación, el personal de enfermería le entregará medicamentos orales, los cuales debe tomar **30 minutos antes de la aplicación** para disminuir el riesgo de posibles alergias al medicamento.

*Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.*

IMPORTANTE

Para la administración de este medicamento, debe **enviar sus resultados de laboratorio** con una antelación mínima de **3 días antes de la aplicación**.

Envíelos en formato PDF o foto legible al correo electrónico:

laboratoriosquimioterapia@husi.org.co

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

La mayoría son leves y temporales. Entre los más frecuentes se encuentran:

- 1 Enrojecimiento**, dolor, endurecimiento o molestia en el sitio de la inyección. Puede quedar una **pequeña protuberancia** local que desaparece con el tiempo.
- 2** Sensación de cansancio o malestar general.
- 3** Fiebre o escalofríos.
- 4** Congestión nasal o tos.
- 5** Náuseas, dolor de cabeza o mareo.
- 6 Reacciones alérgicas** o reacciones relacionadas con la administración (aunque con la formulación subcutánea las reacciones inmediatas son menos frecuentes que con la vía intravenosa).

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE

- 1 Puede regresar a casa el mismo día**, salvo que el equipo médico indique lo contrario.
- 2 Es normal sentir molestia leve**, enrojecimiento o una pequeña protuberancia en el sitio de la inyección (puede ser del tamaño de una lenteja); no la frote, ni la masajee.
- 3 Mantenga una buena hidratación y alimentación balanceada.**
- 4 No aplique vacunas** sin consultar al médico, especialmente durante el tratamiento.
- 5 Evite el contacto cercano** con personas que tengan gripe, infecciones respiratorias o enfermedades contagiosas. **Lávese las manos con frecuencia.**
- 6 Asista puntualmente** a sus controles y exámenes de laboratorio.

**Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.**