

FULVESTRANT 500 MG

¿QUÉ ES?


El **fulvestrant** es un medicamento que actúa bloqueando la acción del **estrógeno**, una hormona femenina que puede estimular el crecimiento de algunos tipos de **cáncer de mama**. Pertenecce al grupo de medicamentos llamados moduladores del receptor de estrógeno.

Al bloquear el estrógeno, las células cancerosas que dependen de esta hormona dejan de crecer y pueden morir. **Se usa principalmente en mujeres con cáncer de mama con receptores hormonales positivos.**

PRESENTACIÓN DE 500 MG

El fulvestrant se administra mediante inyección intramuscular **(generalmente en los glúteos)**. Son dos inyecciones de 250 mg cada una, para una dosis total de 500 mg administrada el mismo día. **Y continua cada mes la aplicación de las 2 inyecciones**

¿DÓNDE SE APLICA?



Cuando es la primera vez se administran las dos inyecciones de 250 mg el primer día.

- Luego se repite la dosis a las **2 semanas**.
- A las **4 semanas** recibirá otra aplicación.
- **Luego continuará con una aplicación cada mes.**

***Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.***



POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Durante el tratamiento con fulvestrant pueden presentarse algunos efectos secundarios, la mayoría son leves y controlables:

- 1 Sofocos o sudoraciones** nocturnas.
- 2** Náuseas, gases o dolor abdominal leve.
- 3** Estreñimiento o diarrea leve.
- 4 Cansancio** o debilidad.
- 5** Dolor de cabeza.
- 6 Dolor** en músculos, articulaciones o espalda.
- 7 Molestia** o enrojecimiento en el sitio de aplicación.
- 8 Disminución del deseo sexual.**

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE

- 1 Mantenga una alimentación equilibrada**, rica en frutas, verduras y proteínas.
- 2 Hidratase bien** durante el tratamiento.
- 3 Realice actividad física suave o moderada**, según su estado de salud, para disminuir fatiga y las molestias articulares.
- 4 Si presenta dolor en el sitio de inyección**, puede aplicar compresas tibias o frías durante las primeras 24 horas.
- 5 Evite el consumo de alcohol y cigarrillo.**
- 6 Informe a su equipo de salud** si presenta **dolor intenso**, inflamación o enrojecimiento persistente en el lugar de la inyección.
- 7 Avise también si nota sangrado vaginal inusual**, ictericia (piel amarilla), dolor abdominal fuerte o debilidad marcada, ya que requieren evaluación médica.
- 8 No suspenda el medicamento** sin indicación médica.
- 9 Asista puntualmente** a sus controles mensuales y seguimientos.

***Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.***