

RITUXIMAB SUBCUTÁNEO 1400MG

¿QUÉ ES?

El Rituximab subcutáneo (1400 mg) es un medicamento de tipo anticuerpo monoclonal, es decir, una sustancia diseñada para reconocer y atacar células específicas del organismo. Este medicamento actúa sobre un tipo de células llamadas linfocitos B, que pueden estar involucradas en algunos tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes.

El Rituximab ayuda a eliminar o controlar estas células anormales, contribuyendo al tratamiento de su enfermedad. Su médico le indicará este medicamento porque considera que es el más adecuado para su diagnóstico y condición actual.

PRESENTACIÓN DE 1400 MG

El rituximab subcutáneo se presenta en una **dosis fija de 1400 mg**, que no depende del peso corporal del paciente, a diferencia de la formulación intravenosa.

Diversos estudios han demostrado que la **eficacia y seguridad** del rituximab subcutáneo **son equivalentes** a la formulación intravenosa, **ofreciendo además un tiempo de administración más corto**.

¿DÓNDE SE APLICA?



Se inyecta directamente bajo la piel (vía subcutánea), generalmente en la **región abdominal**. **Su administración dura 8 minutos aproximadamente.**

Antes de la aplicación, el personal de enfermería le entregará medicamentos orales, los cuales debe tomar **30 minutos antes de la aplicación** para disminuir el riesgo de posibles alergias al medicamento.

*Porque mi salud también está en mis manos,
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.*

IMPORTANTE

Para la administración de este medicamento, **debe enviar sus resultados de laboratorio** con una antelación mínima de **3 días** antes de la aplicación.

Envíelos en formato PDF o foto legible al correo electrónico:

laboratoriosquimioterapia@husi.org.co

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

- 1** **Dolor** o molestia en el sitio de inyección.
- 2** Enrojecimiento, hinchazón o picazón local.
- 3** Hematomas (**moretón**).
- 4** Endurecimiento temporal en el área de aplicación.

En algunos casos poco frecuentes, pueden presentarse:



- Fiebre, escalofríos o malestar general.
- **Reacciones alérgicas** (erupción en la piel, dificultad para respirar, mareo o hinchazón en la cara o labios).
- **Mayor riesgo de infecciones** debido a la disminución de defensas.

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE

- 1** **Es normal sentir molestia leve**, enrojecimiento o una pequeña protuberancia en el sitio de la inyección (puede ser del tamaño de una lenteja); no la frote ni la masajee.
- 2** **Si presenta enrojecimiento**, hinchazón o dolor local, puede aplicar compresas frías de forma intermitente durante las primeras horas.
- 3** **Informe al equipo de enfermería** si nota sangrado, secreción o dolor persistente en el sitio de aplicación.
- 4** Si experimenta fiebre, dificultad para respirar, tos persistente o signos de infección, **comuníquese con su médico tratante o acuda al servicio de urgencias**.
- 5** **Evite automedicarse o suspender el tratamiento** sin indicación médica.

Porque mi salud también está en mis manos, yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.