

# TRASTUZUMAB SUBCUTÁNEO 600MG

## ¿QUÉ ES?

El **trastuzumab** es un medicamento que se usa para tratar algunos tipos de **cáncer de mama, estómago o esófago**. Actúa bloqueando una proteína llamada **HER2**, que en algunos cánceres está en cantidad más alta de lo normal y hace que las células crezcan más rápido. Al bloquear esa proteína, el trastuzumab ayuda a detener o disminuir el crecimiento del cáncer.

## ¿DÓNDE SE APLICA?

La inyección se aplica debajo de la piel (subcutánea), en la parte de afuera del muslo (pierna), **alternando entre pierna izquierda y derecha. Tiene la misma eficacia y seguridad** que la versión intravenosa. Además, su aplicación es más **rápida y cómoda**, ya que dura de **4 a 5 minutos**, mientras que la infusión intravenosa puede tomar varias horas.



- Es posible que sienta una leve molestia o sensación de **presión o ardor durante la aplicación**.
- Por lo general, el Trastuzumab será administrado cada tres semanas lo que implica **1 aplicación cada 21 días**.

## IMPORTANTE

Para la administración de este medicamento, debe **enviar sus resultados de laboratorio** con una antelación mínima de **3 días** antes de la aplicación.

Envíelos en formato PDF o foto legible al correo electrónico:

**[laboratoriosquimioterapia@husi.org.co](mailto:laboratoriosquimioterapia@husi.org.co)**

**Porque mi salud también está en mis manos,  
yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.**

## POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

**La mayoría son leves y temporales. Entre los más frecuentes se encuentran:**

- 1** Dolor, enrojecimiento, picazón o endurecimiento leve en el sitio de aplicación.
- 2** Sensación de calor o sofocos.
- 3** **Cansancio** o malestar general.
- 4** Náuseas leves o dolor de cabeza.

**En algunos casos poco frecuentes pueden presentarse:**



- Fiebre, escalofríos o malestar general.
- **Reacciones alérgicas** (erupción en la piel, dificultad para respirar, mareo o hinchazón en la cara o labios).
- **Dolor en el pecho o palpitaciones.**

El trastuzumab puede **afectar el funcionamiento del corazón**, especialmente si se usa junto con otros medicamentos como antraciclinas (quimioterapia). Por eso, su equipo médico hará controles del corazón (**ecocardiograma**) de manera regular.

## RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE

- 1** **No frote ni masajee el sitio de la inyección** después de la aplicación.
- 2** **Puede aplicar compresas frías** si hay enrojecimiento o molestia local.
- 3** **Informe al equipo de enfermería** si el área presenta dolor intenso, secreción o calor local.
- 4** **Lleve sus exámenes de control y recuerde realizarse el ecocardiograma** (examen del corazón) cuando su médico lo indique.
- 5** Si tiene fiebre, escalofríos, tos persistente, dificultad para respirar o hinchazón en las piernas, **comuníquese de inmediato con su médico o acuda al servicio de urgencias.**
- 6** **Asista puntualmente a las citas programadas** para su tratamiento y no suspenda el medicamento sin indicación médica.
- 7** **Mantenga una alimentación saludable**, haga actividad física según sus posibilidades y evite fumar o consumir alcohol en exceso.

**Porque mi salud también está en mis manos, yo aprendo, yo me cuido... eso es vivir mejor.**